

drie jongen en een ei, en verschillende nesten van scholeksters.

Den 24sten Mei kon langen tijd een paartje boomvalken, *Falco s. subbuteo* L., in de vlucht worden waargenomen. Ongetwijfeld zullen die in de jonge beboschingen van het eiland broeden.


De terugreis, die door den warmen zuiden wind aan een tocht in tropische zeeën deed denken, vormde een waardig slot aan deze genotvolle en interessante dagen.

F. C. VAN HEURN.

Korte mededeelingen.

De lachstern, *Sterna Gelochelidon* Kl., broedvogel in Nederland (met plaat 2).

Toen wij Zaterdag 27 Juni j.l. een bezoek brachten aan de broedkolonies op „de Beer”, Hoek van Holland, deelde de bewaker ons mede, dat hij een nest van de lachstern had gevonden. Het nest was gelegen tusschen de talrijke nesten van de vischdief en bevatte twee eieren; ik maakte er twee foto's van. Bij het naderen van de broedplaats hoorden we al direct de typische roep van de lachstern en ofschoon we daar stonden onder een wolk luid krijschende vischdieven, was dit lachstern-geluid zóó karakteristiek dat het zonder moeite uit al die vogelstemmen te herkennen viel. Wie eenmaal een lachstern goed heeft gehoord, vergeet dit geluid nimmer meer. Moeilijker was het de vogel tusschen de tallooze vischdieven te zien te krijgen; de bewaker, die de soort van vorige jaren reeds kende en daarbij een scherp waarnemer is, hielp ons echter en toen we de lachstern eenmaal in den kijker hadden, vielen al heel duidelijk de verschilpunten met vischdief op. In de eerste plaats is het een zwaardere vogel, met een dikkere kop en opvallend zware, geheel zwarte snavel; de zwarte, althans zeer donkere pooten steken duidelijk af tegen de reinwitte onderzijde, terwijl deze bij een overvliegende vischdief nauwelijks te zien zijn. Ook in den vleugel zijn verschilpunten met vischdief op te merken. Het beste kenmerk vonden we de zware, geheel zwarte, meeuwachtige snavel. De Engelschen noemen de lachstern dan ook zeer terecht „Gull-billed Tern”.



J. P. Strijbos phot.

Moest en eijeren van de lachstern *Sterna Gelocheidon* Kl.: „de Beer”. Hoek van Holland, 27 Juni 1931.

Toen we ons op eenige afstand terugtrokken, streek de lachstern al zeer spoedig op den grond en zat al weer te broeden toen er nog maar enkele vischdiefjes neergestreken waren. Volgens den bewaker was de lachstern zeer fel in het verjagen van scholeksters, die zich hier op „de Beer” als ware nestenplunderaars hebben ontpopt. De jonge scholeksters worden in de Hoeksche sternkolonie door de oude vogels voornamelijk gevoerd met donsjongen van de vischdief en we kunnen op „de Beer” thans spreken van een scholeksterplaag. In één geval werd geconstateerd dat twee jonge scholeksters 13 donsjongen gebracht werden van de vischdief in 6 uur tijd!

Daar we nog nimmer eieren zagen van de lachstern, waren we verrast door de grootte, niet zoo heel veel kleiner dan van de kleine zeemeeuw. In de onmiddellijke nabijheid van het nestkuiltje lag een stukje geknikt wrakhout. Volgens den bewaker had dat aanvankelijk aan de andere zijde van het nest gelegen. Of de lachstern dit gedaan had kon hij ons niet mededeelen. Vorm, kleur en teekening der eieren deed sterk aan meeuwen-eieren denken, stellig niet aan het stern-type. Het nest werd gevonden doordat de bewaker, opmerkzaam gemaakt door de aanwezigheid der lachsterns, zich in de nabijheid achter een duintje verstopte en de vogels afkeek. Dat was op 17 Juni, er waren toen reeds twee eieren; wanneer de vogels met broeden begonnen zijn weten we dus niet. Het is te hopen, dat deze eerste broedpoging van deze fraaie stern-soort met succes bekroond wordt.

J. P. STRIJBOS.

Winterwaarnemingen van de witte kwikstaart, *Motacilla a. alba* L.

Deze winter zag ik nog — behalve de in dit tijdschrift, 3, 1931, p. 148, vermelde voorwerpen — 1 ex. op 25 Januari, 2 ex. op 22 Februari en 1 zingend ex. op 1 Maart, alle bij Eindhoven. De trekkers kwamen, door de strenge koude van 5-11 Maart, later dan gewoonlijk terug en wel omstreeks 20 Maart.

P. Bouwe JANSEN.

Op 30 (of 31) Januari zag de bewaker van het Kamper-eiland aldaar één voorwerp. Men zie verder o.a. *Ardea*, 8, p. 76 en 103, 10, p. 114, 11, p. 133, 17, p. 44 en 19, p. 60. (t. K.)

Trekrichting van de groote gele kwikstaart, *Motacilla c. cinerea* Tunst., bij Eindhoven.

De trekrichting van de groote gele kwikstaart is bij Eind-